



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Πορτοκαλιά

Στάδιο Ανάπτυξης	Έναρξη ανοιξιότικης βλάστησης	Έναρξη άνθησης	Ανθοφορία	Τέλος άνθησης - Καρπόδεση	Ανάπτυξη καρπών	Ωρίμανση καρπών	Μετά τη συγκομιδή

YaraMila™

COMPLEX ή TIGER ή SPRINTER 60-80 kg/στρ.

COMPLEX ή TIGER 15-20 kg/στρ.

YaraRega™

9-5-26 ή 9-0-36 10-20 kg/στρ.

YaraLiva™

NITRABOR ή TROPICOTE 25-30 kg/στρ.

YaraTera™

BOLIKEL 50-100 gr/φυτό

BOLIKEL 50 gr/φυτό

YaraVita™

GRAMITREL 500 ml/στρ.

FRUTREL 0,5-1 lit/στρ.

POWERBOR Ca 300-500 ml/στρ.

GRAMITREL 500 ml/στρ.

STOPIT 500 ml/στρ.

COPTREL 200 ml/στρ.

YaraAmplix™

OPTITRAC 300 ml/στρ.

OPTIMARIS 200 ml/στρ.


ACTISIL 50-100 ml/στρ.

OPTIVI 250-500 ml/στρ

OPTIVI 250-500 ml/στρ

■ Εφαρμογή εδάφους

■ Διαφυλλική εφαρμογή



- 1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα με πυκνότητα φύτευσης 40 δένδρα/στρ. και αναμενόμενη παραγωγή 3-4 tn/στρ.
- 2| Βασική λίπανση: Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX, TIGER ή SPRINTER, ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων). Εναλλακτικά μπορείτε να εφαρμόσετε το CROPCARE 11-15-15+7CaO+15SO₃ + ιχνοστοιχεία.
 - Επιλεγμένοι τύποι λιπασμάτων της σειράς YaraMila διατίθενται με επικάλυψη τεχνολογίας PROCOTE με ιχνοστοιχεία ή με τεχνολογία παρεμπόδισης αζώτου. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.
- 3| Η εφαρμογή του YaraLiva NITRABOR ή YaraLiva TROPICOTE μπορεί να μοιραστεί σε 2 δόσεις. Η 1η δόση με 10kg/στρ. στην έναρξη της ανοιξιάτικης βλάστησης και η 2η δόση 15-20 kg/στρ. στο τέλος της ανθοφορίας – καρπόδεση. Εναλλακτικά, όλη η ποσότητα να εφαρμοστεί στο τέλος της ανθοφορίας – καρπόδεση.
- 4| Η σειρά YaraRega αποτελείται από κοκκώδη υδατοδιαλυτά λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν μέσω συστημάτων υδρολίπανσης ή επιφανειακά στο έδαφος.
- 5| YaraVita:
 - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
 - Στο στάδιο της καρπόδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί το YaraVita SENIPHOS αντί του YaraVita POWERBOR Ca.
- 6| YaraAmplix:

Η σειρά YaraAmplix περιλαμβάνει τους βιοδιεγέρτες της Yara. Οι βιοδιεγέρτες επηρεάζουν θετικά την αποδοτικότητα χρήσης των θρεπτικών στοιχείων, την αντοχή των φυτών σε συνθήκες αβιοτικών καταπονήσεων (στρες), τα χαρακτηριστικά της ποιότητας παραγωγής και τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων που συγκρατούνται στο έδαφος και στη ριζόσφαιρα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την υπηρεσία [Tankmix](#) στον υπολογιστή ή το smartphone σας, για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ και βιοδιεγερτών YaraAmplix™ μεταξύ τους, καθώς και με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Πορτοκαλιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση

Στάδιο Ανάπτυξης	Έναρξη ανοιξιότικης βλάστησης	Έναρξη άνθησης	Ανθοφορία	Τέλος άνθησης - Κερφόδεση	Ανάπτυξη καρπών	Ωρίμανση καρπών	Μετά τη συγκομιδή

YaraMila™

COMPLEX ή TIGER ή SPRINTER 60-80 kg/στρ.

YaraRega™

16-10-16 ή 15-15-15 15 kg/στρ.

9-5-26 ή 9-0-36 10-15 kg/στρ.

YaraTera™

CALCINIT 25 kg/στρ.

BOLIKEL 50-100 gr/φυτό

BOLIKEL 50 gr/φυτό

YaraVita™

GRAMITREL 500 ml/στρ.

FRUTREL 0,5-1 lit/στρ

POWERBOR Ca 300-500 ml/στρ.

GRAMITREL 500 ml/στρ.

STOPIT 500 ml/στρ.

COPTREL 200 ml/στρ.

YaraAmplix™

OPTITRAC 300 ml/στρ.


OPTIMARIS 200 ml/στρ.

ACTISIL 50-100 ml/στρ.

OPTIVI 250-500 ml/στρ

OPTIVI 250-500 ml/στρ

OPTINUE 200-400 ml/στρ.



- 1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα με πυκνότητα φύτευσης 40 δένδρα/στρ. και αναμενόμενη παραγωγή 3-4 tn/στρ.
- 2| Βασική λίπανση: Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX, TIGER ή SPRINTER, ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων). Εναλλακτικά μπορείτε να εφαρμόσετε το CROPCARE 11-15-15+7CaO+15SO₃ + ιχνοστοιχεία.
 - Επιλεγμένοι τύποι λιπασμάτων της σειράς YaraMila διατίθενται με επικάλυψη τεχνολογίας PROCOTE με ιχνοστοιχεία ή με τεχνολογία παρεμπόδισης αζώτου. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.
- 3| Η σειρά YaraRega αποτελείται από κοκκώδη υδατοδιαλυτά λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν μέσω συστημάτων υδρολίπανσης ή επιφανειακά στο έδαφος.
- 4| Υδρολίπανση: Εναλλακτικά με τη σειρά YaraRega μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραπλήσιοι τύποι των κρυσταλλικών λιπασμάτων από τις σειρές YaraTera KRISTALON και YaraTera DELTASPRAY.
- 5| Η εφαρμογή του YaraTera CALCINIT μπορεί να μοιραστεί σε 2 δόσεις. Η 1η δόση με 10 kg/στρ. στην έναρξη της ανθοφορίας και η 2η δόση 15 kg/στρ. στο τέλος της ανθοφορίας – καρπώδους. Εναλλακτικά, όλη η ποσότητα να εφαρμοστεί στο τέλος της ανθοφορίας – καρπώδους.
- 6| YaraVita:
 - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
 - Στο στάδιο της καρπώδους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το YaraVita SENIPHOS αντί του YaraVita POWERBOR Ca.
- 7| YaraAmplix:

Η σειρά YaraAmplix περιλαμβάνει τους βιοδιεγέρτες της Yara. Οι βιοδιεγέρτες επηρεάζουν θετικά την αποδοτικότητα χρήσης των θρεπτικών στοιχείων, την αντοχή των φυτών σε συνθήκες αβιοτικών καταπονήσεων (στρες), τα χαρακτηριστικά της ποιότητας παραγωγής και τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων που συγκρατούνται στο έδαφος και στη ριζόσφαιρα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την υπηρεσία [Tankmix](#) στον υπολογιστή ή το smartphone σας, για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ και βιοδιεγερτών YaraAmplix™ μεταξύ τους, καθώς και με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.

