



Knowledge grows

Η σημασία των λιπασμάτων Νιτρικού Ασβεστίου της Yara





Knowledge grows

Η φιλοδοξία της Yara

Οι περιβαλλοντικές και οι εμπορικές προκλήσεις των τελευταίων ετών έχουν φανερώσει πόσο εύθραυστο είναι το σύστημα παραγωγής τροφίμων. Ένα ανθεκτικότερο σύστημα παραγωγής μπορεί να συμβάλει με ουσιαστικό τρόπο σε σταθερότερες αποδόσεις με βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, προς όφελος της ανθρώπινης υγείας.

Ως η μόνη παγκόσμια εταιρεία θρέψης των καλλιεργειών, με περισσότερα από 100 χρόνια αγρονομικής εξειδίκευσης, η Yara ηγείται της αλλαγής αυτής με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων που βασίζονται στην γνώση και την τεχνολογία.

Βασικό κομμάτι της φιλοδοξίας μας είναι η ανταλλαγή γνώσης

σε παγκόσμιο επίπεδο. Βοηθάμε τους αγρότες να παράξουν τροφή με μετρήσιμο τρόπο -υπεύθυνα- προστατεύοντας το περιβάλλον και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής.

Υπό το πρίσμα αυτό και για να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε την αποστολή της Yara -να θρέψει υπεύθυνα τον παγκόσμιο πληθυσμό και να προστατεύει τον πλανήτη- αναπτύσσουμε ένα μέλλον με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Η Yara ιδρύθηκε το 1905 για να αντιμετωπίσει το τότε αναδυόμενο επισιτιστικό πρόβλημα της Ευρώπης. Σήμερα, έχει παγκόσμια παρουσία με σχεδόν 17.000 υπαλλήλους, καταγράφοντας πωλήσεις σε 160 χώρες.



Λιπάσματα Νιτρικού Ασβεστίου Yara

Το κλειδί για την παραγωγή
προϊόντων υψηλής αξίας και μεγάλης
εμπορευσιμότητας



Η σειρά των λιπασμάτων Νιτρικού Ασβεστίου της Yara αποτελείται από το YaraTera™ CALCINIT™, το YaraLiva™ NITRABOR™ και το YaraLiva™ TROPICOTE™. Περιέχουν ασβέστιο και άζωτο υψηλής διαλυτότητας, άμεσα διαθέσιμα για τα φυτά.

Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών είναι:

- Ιδανική αναλογία ασβεστίου - αζώτου, που ευνοεί την απορρόφηση του ασβεστίου σε μεγάλες ποσότητες
- Τεχνολογία που εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά
- Εγγυημένη σύσταση





YaraTera™ CALCINIT™

Το YaraTera™ CALCINIT™ είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο λίπασμα με πλήρως υδατοδιαλυτό ασβέστιο και άζωτο σε νιτρική μορφή, για εφαρμογή μέσω συστημάτων υδρολίπανσης. Είναι προϊόν υψηλής καθαρότητας, που διαλύεται πλήρως στο νερό της άρδευσης και είναι κατάλληλο για όλα τα συστήματα υδρολίπανσης, ακόμα και για την υδροπονία.

Το YaraTera™ CALCINIT™ παρέχει τα πλεονεκτήματα της γρήγορης δράσης και άμεσης διαθεσιμότητας των δύο στοιχείων του. Η αναλογία μεταξύ

ασβεστίου και αζώτου στο YaraTera™ CALCINIT™ διασφαλίζει τη σωστή ανάπτυξη της καλλιέργειας με υψηλή ποιότητα παραγωγής.


Η συνδυασμένη εφαρμογή ασβεστίου και νιτρικού αζώτου βοηθάει την καλύτερη απορρόφηση του ασβεστίου από τις ρίζες των φυτών.

Το YaraTera™ CALCINIT™ μπορεί να συνδυαστεί με άλλα υδατοδιαλυτά σκευάσματα, εκτός από λιπάσματα υψηλής περιεκτικότητας φωσφόρου και θείου.



Το YaraTera™ CALCINIT™ κάνει το μαρούλι πιο τραγανό!

Δοκιμή σε 3 τύπους μαρουλιού



REF: SIMONNE ET AL., 2001



YaraLiva™ TROPICOTE™

Το YaraLiva™ TROPICOTE™ είναι ένα υψηλής ποιότητας λίπασμα νιτρικού ασβεστίου σχεδιασμένο για εδαφικές εφαρμογές.

Διαθέτει υδατοδιαλυτό ασβέστιο, που συμβάλλει στην καλύτερη ανάπτυξη του φυτού, χωρίς στρες, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα παραγωγής και μεγαλύτερη διατηρησιμότητα, ενώ το άμεσα διαθέσιμο νιτρικό άζωτο συμβάλλει στη γρήγορη και ελεγχόμενη ανάπτυξη της καλλιέργειας.

Η συνδυασμένη εφαρμογή ασβεστίου και

νιτρικού αζώτου βοηθά στην καλύτερη απορρόφηση του ασβεστίου από τις ρίζες των φυτών.

Το YaraLiva™ TROPICOTE™ έχει μια μοναδική τεχνολογία επικάλυψης, η οποία εφαρμόζεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια των κόκκων, διασφαλίζοντας ότι κάθε κόκκος λιπάσματος προστατεύεται από την απορρόφηση υγρασίας κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής του.

Το YaraLiva™ TROPICOTE™ χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα καλλιεργειών υψηλής αξίας σε όλο τον κόσμο.

Κόκκοι λιπάσματος κατά τη στιγμή έκθεσης σε συνθήκες υγρασίας



*Σε συνθήκες αποθήκευσης

2,5 ώρες μετά την έκθεση σε συνθήκες υγρασίας





YaraLiva™ NITRABOR™

Το YaraLiva™ NITRABOR™ είναι ένα κοκκώδες λίπασμα νιτρικού ασβεστίου κατάλληλο για εδαφικές εφαρμογές. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του YaraLiva™ TROPICOTE™ με τη διαφορά ότι περιέχει βόριο.

Το βόριο που περιέχει το YaraLiva™ NITRABOR™ κάνει το σκεύασμα κατάλληλο για χρήση του σε καλλιέργειες που είναι ιδιαίτερα απαιτητικές στο στοιχείο αυτό, όπως η ελιά ή τα σταυρανθή.

Το βόριο είναι στοιχείο που λειτουργεί επιπλέον και σαν καταλύτης επιταχύνοντας την πρόσληψη του ασβεστίου από το εδαφικό διάλυμα, ενώ αυξάνει

την κινητικότητα του μέσα στο φυτό και κυρίως προς τους καρπούς. Η επικάλυψη των κόκκων είναι ίδια με του YaraLiva™ TROPICOTE™, παρέχοντας όμοια πλεονεκτήματα στον χειρισμό του διασφαλίζοντας ότι κάθε κόκκος λιπάσματος προστατεύεται από την απορρόφηση υγρασίας κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής του.

Πειράματα έχουν δείξει ότι το YaraLiva™ NITRABOR™ βελτιώνει τη συνεκτικότητα των καρπών, ενώ συμβάλλει στην αύξηση της απόδοσης και της ποιότητας των καλλιεργειών.

Θρεπτικές διαταραχές και προτάσεις αντιμετώπισης

Αναφέρονται συνολικές ποσότητες για τη διάρκεια μιας καλλιεργητικής περιόδου. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το δίκτυο συνεργατών της Yara Ελλάς.



Εμποδίζει την εμφάνιση της ξηρής κορυφής στην τομάτα (τάπα)



Ασβέστιο



Ασβέστιο



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ



Για θερμοκηπιακή παραγωγή
ισοδύναμη των 10 τόνων ανά στρέμμα:

💧 30-50 kg ανά στρέμμα YaraTera™ CALCINIT™,
μέσω υδρολίπανσης

Από το στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης μέχρι και τη συγκομιδή.



Υπαίθρια τομάτα και βιομηχανική για
παραγωγή ισοδύναμη των 10 τόνων ανά
στρέμμα:


💧 25-40 kg ανά στρέμμα YaraTera™ CALCINIT™
μέσω υδρολίπανσης

Από το στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης μέχρι και τη συγκομιδή.

Διασφαλίζει την ποιότητα των καρπών



Ασβέστιο



Ασβέστιο



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ



Για παραγωγή ισοδύναμη των 4 τόνων ανά στρέμμα:

💧 20-30 kg ανά στρέμμα YaraTera™ CALCINIT™
μέσω υδρολίπανσης

Από το στάδιο της εγκατάστασης της καλλιέργειας μέχρι και τη συγκομιδή.

Μειώνει την εμφάνιση της πικρής κηλίδωσης



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Για παραγωγή ισοδύναμη των 3 τόνων ανά στρέμμα:

Με την εμφάνιση των πρώτων φύλλων

✓ 20-30 kg ανά στρέμμα YaraLiva™ TROPICOTE™ ή YaraLiva™ NITRABOR™ εδαφικά.

Μετά τη συγκομιδή και πριν την πτώση των φύλλων

✓ 5-10 kg ανά στρέμμα YaraLiva™ TROPICOTE™ ή YaraLiva™ NITRABOR™ εδαφικά.

Βελτιώνει την ποιότητα των ριζωμάτων



Ασβέστιο



Ασβέστιο

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Για παραγωγή ισοδύναμη των 6-8 τόνων ανά στρέμμα:

💧 20-25 kg ανά στρέμμα YaraTera™ CALCINIT™ μέσω υδρολίπανσης

Ή

✓ 20-30 kg ανά στρέμμα YaraLiva™ TROPICOTE™ ή YaraLiva™ NITRABOR™ επιφανειακά

Εφαρμόστε σταδιακά από το στάδιο εγκατάστασης της καλλιέργειας μέχρι και τη συγκομιδή

Συμβάλλει στην ποιότητα των κονδύλων



Ασβέστιο



Ασβέστιο



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Για παραγωγή ισοδύναμη των 4 τόνων ανά στρέμμα:

✓ 20-30 kg ανά στρέμμα YaraLiva™ TROPICOTE™ ή YaraLiva™ NITRABOR™ στην έναρξη του σχηματισμού των κονδύλων σε εδαφικές εφαρμογές.

Ή

💧 20-25 kg ανά στρέμμα YaraTera™ CALCINIT™ μέσω υδρολίπανσης με την έναρξη του σχηματισμού των κονδύλων.

Μειώνει το εσωτερικό καφέτισμα της πατάτας



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Για παραγωγή ισοδύναμη των 4 τόνων ανά στρέμμα:

✓ 20-30 kg ανά στρέμμα YaraLiva™ TROPICOTE™ ή YaraLiva™ NITRABOR™ στην έναρξη του σχηματισμού των κονδύλων σε εδαφικές εφαρμογές.

Ή

💧 20-25 kg ανά στρέμμα YaraTera™ CALCINIT™ μέσω υδρολίπανσης με την έναρξη του σχηματισμού των κονδύλων.

Μειώνει τη σήψη της κορυφής στην πιπεριά (ξηρή κορυφή)



Ασβέστιο



Ασβέστιο



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ



Πιπεριά θερμοκηπίου τύπου φλάσκα για παραγωγή ισοδύναμη των 10-12 τόνων ανά στρέμμα:

💧 30-50 kg ανά στρέμμα YaraTera™ CALCINIT™

Από την περίοδο της έντονης ανάπτυξης μέχρι και τη συγκομιδή.



Υπαίθρια πιπεριά τύπου φλάσκα για παραγωγή ισοδύναμη των 3 τόνων ανά στρέμμα:

💧 25-30 kg ανά στρέμμα YaraTera™ CALCINIT™ μέσω υδρολίπανσης

Από την περίοδο της έντονης ανάπτυξης μέχρι και τη συγκομιδή.

Μειώνει το κάψιμο της κορυφής



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Για παραγωγή ισοδύναμη του 1,5 τόνου ανά στρέμμα:

✓ 25-30 kg ανά στρέμμα YaraLiva™ TROPICOTE™ ή YaraLiva™ NITRABOR™ σε 2-3 εδαφικές εφαρμογές μετά τις πρώτες 2 εβδομάδες από την εγκατάσταση της καλλιέργειας.

Ή

💧 20-25 kg ανά στρέμμα YaraTera™ CALCINIT™ μέσω υδρολίπανσης σε 2-3 εφαρμογές μετά τις πρώτες 2 εβδομάδες από την εγκατάσταση της καλλιέργειας.

Μειώνει το κάψιμο της κορυφής και το μαύρισμα της ανθοκεφαλής



Ασβέστιο



Ασβέστιο



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Για παραγωγή ισοδύναμη των 3 τόνων ανά στρέμμα:

Από το στάδιο των 4-6 φύλλων μέχρι και το σχηματισμό της κεφαλής εφαρμόστε συνοδικά

✓ 25-30 kg ανά στρέμμα YaraLiva™ NITRABOR™ σε εδαφικές εφαρμογές.

Ή

💧 20-25 kg ανά στρέμμα YaraTera™ CALCINIT™ μέσω υδρολίπανσης.

Μειώνει την εμφάνιση ξηρής κορυφής



Ασβέστιο



Ασβέστιο



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Για παραγωγή ισοδύναμη των 5 τόνων ανά στρέμμα:

Σε 3 εφαρμογές, κατά τη βλαστική ανάπτυξη, την άνθιση - καρπόδεση και την αύξηση του καρπού εφαρμόστε συνολικά

💧 20-25 kg / στρέμμα YaraTera™ CALCINIT™ μέσω υδρολίπανσης.

Ή

Κατά την άνθιση - καρπόδεση εφαρμόστε συνολικά

✓ 25-30 kg ανά στρέμμα YaraLiva™ TROPICOTE™ ή YaraLiva™ NITRABOR™ σε εδαφικές εφαρμογές.

Μειώνει το σχίσσιμο των καρπών στο αμπέλι



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Οινοποιήσιμο Σταφύλι, για παραγωγή ισοδύναμη του 1 τόνου καρπού ανά στρέμμα:

- ✓ 15-25 kg ανά στρέμμα YaraLiva™ TROPICOTE™ ή YaraLiva™ NITRABOR™ σε εδαφικές εφαρμογές πριν από την έναρξη της ανθοφορίας έως τον περκασμό.

Ή

- ✓ 10-20 kg ανά στρέμμα YaraTera™ CALCINIT™ σε περίπτωση υδρολίπανσης και επαναλάβετε την εφαρμογή στο στάδιο του σχηματισμού των καρπών.

Μετά τη συγκομιδή και προτού πέσουν τα φύλλα εφαρμόστε

- ✓ 5-10 kg ανά στρέμμα YaraLiva™ TROPICOTE™ ή YaraLiva™ NITRABOR™

Ή

- ✓ 5-10 kg ανά στρέμμα YaraTera™ CALCINIT™ μέσω υδρολίπανσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Επιτραπέζιο Σταφύλι, για παραγωγή ισοδύναμη των 2-3 τόνων καρπού ανά στρέμμα:

- ✓ 20-25 kg ανά στρέμμα YaraLiva™ TROPICOTE™ ή YaraLiva™ NITRABOR™ σε εδαφικές εφαρμογές πριν από την έναρξη της ανθοφορίας έως τον περκασμό.

Ή

- ✓ 15-20 kg ανά στρέμμα YaraTera™ CALCINIT™ σε περίπτωση υδρολίπανσης και επαναλάβετε την εφαρμογή στο στάδιο του σχηματισμού των καρπών.

Μετά τη συγκομιδή και προτού πέσουν τα φύλλα εφαρμόστε

- ✓ 5-10 kg ανά στρέμμα YaraLiva™ TROPICOTE™ ή YaraLiva™ NITRABOR™

Ή

- ✓ 5-10 kg ανά στρέμμα YaraTera™ CALCINIT™ μέσω υδρολίπανσης.

Μειώνει το σχίσμο των καρπών



Ασβέστιο



Ασβέστιο



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Για την παραγωγή 30-40 kg καρπού ανά δένδρο:

Στο στάδιο από την πτώση πετάλων και έπειτα εφαρμόστε

✓ 20-25 kg ανά στρέμμα YaraLiva™ NITRABOR™ ή YaraLiva™ TROPICOTE™.

Στο στάδιο μετά τη συγκομιδή και πριν την πτώση των φύλλων εφαρμόστε

✓ 5-10 kg ανά στρέμμα YaraLiva™ NITRABOR™ ή YaraLiva™ TROPICOTE™.

Μειώνει το σχίσσιμο των καρπών



Ασβέστιο



Ασβέστιο

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Για παραγωγή ισοδύναμη των 3 τόνων ανά στρέμμα:

Από το στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης μέχρι και την ωρίμανση του καρπού εφαρμόστε συνοδικά

💧 20-25 kg / στρέμμα YaraTera™ CALCINIT™ μέσω υδρολίπανσης.

Ή

✓ 25-30 kg ανά στρέμμα YaraLiva™ TROPICOTE™ ή YaraLiva™ NITRABOR™ σε εδαφικές εφαρμογές.

Μειώνει το σχίσσιμο των καρπών



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Για παραγωγή ισοδύναμη των 2-3 τόνων καρπού ανά στρέμμα:

✓ 25-30 kg ανά στρέμμα YaraLiva™ NITRABOR™ ή YaraLiva™ TROPICOTE™ στο στάδιο της άνθησης μέχρι και την καρπόδεση.

Ή

💧 20-25 kg ανά στρέμμα YaraTera™ CALCINIT™ (σπαστά σε 3-4 εφαρμογές).

Μειώνει το σχίσσιμο των καρπών



Ασβέστιο



Ασβέστιο

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Για την παραγωγή 40-50 kg καρπού ανά δένδρο:

Στο στάδιο από την πτώση πετάλων και έπειτα εφαρμόστε

✓ 20-25 kg ανά στρέμμα YaraLiva™ NITRABOR™ ή YaraLiva™ TROPICOTE™.

Στο στάδιο μετά τη συγκομιδή και πριν την πτώση των φύλλων εφαρμόστε

✓ 5-10 kg ανά στρέμμα YaraLiva™ NITRABOR™ ή YaraLiva™ TROPICOTE™.

Περιορίζει τις μετασυλλεκτικές σήψεις



Ασβέστιο



Ασβέστιο

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Για παραγωγή ισοδύναμη των 3 τόνων ανά στρέμμα:

Στο στάδιο των 3-9 φύλλων και λίγο πριν την έναρξη σχηματισμού του βοήβου εφαρμόστε συνολικά

✓ 25-30 kg ανά στρέμμα YaraLiva™ TROPICOTE™ ή YaraLiva™ NITRABOR™ σε εδαφικές εφαρμογές.

Ή

💧 20-25 kg ανά στρέμμα YaraTera™ CALCINIT™ μέσω υδρολίπανσης.

Λοιπές ενδεικτικές προτάσεις λίπανσης



Ακτινίδιο

Προτεινόμενη λίπανση για την παραγωγή 4 τόνων καρπού ανά στρέμμα:

Αρχή άνθησης - καρπόδεση:

✓ 30-40 kg ανά στρέμμα YaraLiva™ TROPICOTE™

Ή

💧 25-30 kg ανά στρέμμα YaraTera™ CALCINIT™

Μετά τη συγκομιδή και πριν το ξεκίνημα της πτώσης των φύλλων εφαρμόστε

✓ 5-10 kg ανά στρέμμα YaraLiva™ TROPICOTE™.

Λοιπές ενδεικτικές προτάσεις λίπανσης



Βερίκοκο

Προτεινόμενη λίπανση για την παραγωγή 2-3 τόνων ανά στρέμμα:

Στο στάδιο από την πτώση πετάλων και έπειτα εφαρμόστε

- ✓ 15-25 kg ανά στρέμμα YaraLiva™ NITRABOR™ ή YaraLiva™ TROPICOTE™.

Στο στάδιο μετά τη συγκομιδή και πριν την πτώση των φύλλων εφαρμόστε

- ✓ 10-20 kg ανά στρέμμα YaraLiva™ NITRABOR™ ή YaraLiva™ TROPICOTE™.

Λοιπές ενδεικτικές προτάσεις λίπανσης



Ελιά

**Προτεινόμενη λίπανση για παραγωγή
30-50 kg καρπού ανά δένδρο:**

Την περίοδο του κροκιάσματος μέχρι και τον σχηματισμό του καρπού εφαρμόστε

▼ 0,5-1 kg ανά δένδρο YaraLiva™ NITRABOR™ ή
YaraLiva™ TROPICOTE™

Ή

💧 0,5-1 kg ανά δένδρο YaraTera™ CALCINIT™ συνολικά.

Αποποίηση ευθυνών: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έντυπο, βασίζονται στις γνώσεις και την αξιοπιστία της Yara. Οι συνθήκες χρήσης και εφαρμογής των προτεινόμενων σκευασμάτων και οι συστάσεις είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Οι συστάσεις προορίζονται ως γενική κατεύθυνση και θα πρέπει να προσαρμόζονται στις επικρατούσες συνθήκες. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου. Η Yara αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση από τη χρήση των σκευασμάτων και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές ειδικές, τυχαίες ή συνεπακόλουθες από τη χρήση των σκευασμάτων της. Οι ακριβείς δοσολογίες ανά προϊόν, η εποχή εφαρμογής και ο συνδυασμός των προϊόντων καθορίζονται από τις επικρατούσες συνθήκες ανά περιοχή, τις καλλιεργούμενες ποικιλίες και την αναμενόμενη απόδοση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το δίκτυο συνεργατών της Yara Ελλάς.

Οι πληροφορίες που περιέχει το παρόν έντυπο παρέχονται από την Yara Ελλάς Α.Ε., ανταποκρίνονται στις σημερινές γνώσεις και δεν μπορούν να θεωρηθούν πλήρεις. Η Yara Ελλάς Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν από ενδεχόμενες ανακρίβειες ή παραλήψεις στις εν λόγω πληροφορίες ή σε οποιαδήποτε ειδική εφαρμογή τους. Οι συστάσεις που αναφέρονται - συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τις «δοσολογίες» - πρέπει να προσαρμόζονται οπωσδήποτε στις εκάστοτε συνθήκες χρήσης, όπως τα χαρακτηριστικά του εδάφους, οι κλιματικές συνθήκες, οι ποικιλίες και άλλοι σημαντικοί παράγοντες. Η Yara δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην καταλληλότητα των συστάσεων αυτών, ούτε παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα ή την καταλληλότητα του προϊόντος για ειδικούς σκοπούς.

Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και οι συσκευασίες που κυκλοφορούν στην αγορά μπορεί να διαφέρουν.

* Οι αποδόσεις και οι συνιστώμενες ποσότητες που αναφέρονται στο παρόν έντυπο είναι ενδεικτικές και αφορούν τη διάρκεια μιας καλλιεργητικής περιόδου.



Yara Ελλάς Α.Ε.

Λεωφ. Συγγρού 143 - 171 21 Νέα Σμύρνη

Τηλ: +30 210 9370355, [f](#) [@](#) Yara Ελλάς

www.yara.gr | info.hellas@yara.com