



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Μηλιά

Στάδιο Ανάπτυξης	Φούσκωμα οφθαλμών	Πράσινη κορυφή	Ροζ κορυφή	Ανθοφορία	Πτώση πετάλων- Έναρξη καρπόδεσης	Νεαρό καρπίδιο	Ανάπτυξη καρπού	Ωρίμανση	Μετά τη συγκομιδή

YaraMila™

COMPLEX ή TIGER ή SPRINTER
50-60 kg/στρ.

COMPLEX ή TIGER
25-30 kg/στρ.

COMPLEX
10-15 kg/στρ.

YaraRega™

9-5-26 ή 9-0-36
10-20 kg/στρ.

YaraLiva™

NITRABOR ή TROPICOTE
30-40 kg/στρ.

NITRABOR
ή
TROPICOTE
10-15 kg/στρ.

YaraTera™

BOLIKEL
5-10
kg/στρ.

YaraVita™

BUD BOOST
0,5-1 lit/στρ.

BORTRAC
200 ml/στρ.

FRUITREL
0,5-1 lit/στρ.

CROP BOOST
300-500
ml/στρ.

STOPIT
1 lit/στρ.

POWERBOR Ca
300-500
ml/στρ.

COPTREL
50 ml/στρ.

COPTREL
50 ml/στρ.

YaraAmplix™

OPTITRAC
300 ml/στρ.

OPTIMARIS
200 ml/στρ.


ACTISIL
50-100 ml/στρ.

OPTIVI
250-500 ml/στρ

OPTIVI
250-500 ml/στρ

■ Εφαρμογή εδάφους

■ Διαφυλλική εφαρμογή



- 1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα με πυκνότητα φύτευσης 250-350 δένδρα/στρ. και αναμενόμενη παραγωγή 4-5tn/στρ.
- 2| Βασική λίπανση: Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX, TIGER ή SPRINTER, ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων). Εναλλακτικά μπορείτε να εφαρμόσετε το CROPCARE 11-15-15+7CaO+15SO₃ + ιχνοστοιχεία.
- Επιλεγμένοι τύποι λιπασμάτων της σειράς YaraMila διατίθενται με επικάλυψη τεχνολογίας PROCOTE με ιχνοστοιχεία ή με τεχνολογία παρεμπόδισης αζώτου. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.
- 3| Η εφαρμογή του YaraLiva NITRABOR ή YaraLiva TROPICOTE συνίσταται να γίνει μοιραστεί σε 2 δόσεις. Η πρώτη δόση με 10-15 kg/στρ. κοντά στο στάδιο της ροζ κορυφής και η δεύτερη δόση 20-25 kg/στρ. στο τέλος της ανθοφορίας – καρπώδεση. Εναλλακτικά, ολόκληρη η ποσότητα να εφαρμοστεί στο τέλος της ανθοφορίας – καρπώδεση.
- 4| Η σειρά YaraRega αποτελείται από κοκκώδη υδατοδιαλυτά λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν μέσω συστημάτων υδρολίπανσης ή επιφανειακά στο έδαφος.
- 5| YaraVita:
 - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
 - Στο στάδιο της πτώσης πετάλων και της καρπώδεσης μπορεί, αντί του YaraVita FRUTREL, να χρησιμοποιηθεί το YaraVita SENIPHOS.
 - Στις μετασυλλεκτικές εφαρμογές, εναλλακτικά με το YaraVita POWERBOR Ca μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός YaraVita ZINTRAC + YaraVita BORTRAC.
 - Για την ενίσχυση του κόκκινου χρώματος των καρπών (κόκκινες ποικιλίες) εφαρμόστε 1 με 2 ψεκασμούς του YaraVita SENIPHOS στην αλλαγή του χρώματος των καρπών και 7 ημέρες αργότερα. Να αποφεύγεται ο συνδυασμός του YaraVita SENIPHOS με διαφυλλικά σκευάσματα που περιέχουν ασβέστιο.
- 6| YaraAmplix:

Η σειρά YaraAmplix περιλαμβάνει τους βιοδιεγέρτες της Yara. Οι βιοδιεγέρτες επηρεάζουν θετικά την αποδοτικότητα χρήσης των θρεπτικών στοιχείων, την αντοχή των φυτών σε συνθήκες αβιοτικών καταπονήσεων (στρες), τα χαρακτηριστικά της ποιότητας παραγωγής και τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων που συγκρατούνται στο έδαφος και στη ριζόσφαιρα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την υπηρεσία [Tankmix](#) στον υπολογιστή ή το smartphone σας, για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ και βιοδιεγερτών YaraAmplix™ μεταξύ τους, καθώς και με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Μηλιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση

Στάδιο Ανάπτυξης	Φούσκωμα οφθαλμών	Πράσινη κορυφή	Ροζ κορυφή	Ανθοφορία	Πτώση πετάλων- Έναρξη καρπώσεως	Νεαρό καρπίδιο	Ανάπτυξη καρπού	Ωρίμανση	Μετά τη συγκομιδή

YaraMila™

COMPLEX ή TIGER
ή SPRINTER
50-60 kg/στρ.

YaraRega™

15-15-15 ή 16-10-16
15-20 kg/στρ.

16-10-16 ή
15-15-15
10 kg/στρ.

9-5-26 ή 9-0-36
10-15 kg/στρ.

YaraTera™

BOLIKEL
5-10
kg/στρ.

CALCINIT
25-30 kg/στρ.

CALCINIT
10 kg/στρ.

YaraVita™

BUD BOOST
0,5-1 lit/στρ.

BORTRAC
200 ml/στρ.

FRUTREL
0,5-1 lit/στρ.

CROP BOOST
300-500
ml/στρ.

STOPIT
1 lit/στρ.

POWERBOR Ca
300-500
ml/στρ.

COPTREL
50 ml/στρ.

COPTREL
50 ml/στρ.

YaraAmplix™

OPTITRAC
300 ml/στρ.

OPTIMARIS
200 ml/στρ.

ACTISIL
50-100 ml/στρ.

OPTIVI
250-500 ml/στρ


OPTIVI
250-500 ml/στρ

OPTINUE
200-400 ml/στρ.

■ Εφαρμογή εδάφους

■ Υδρολίπανση

■ Διαφυλλική εφαρμογή



- 1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα με πυκνότητα φύτευσης 250-350 δένδρα/στρ. και αναμενόμενη παραγωγή 4-5tn/στρ.
- 2| Βασική λίπανση: Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX, TIGER ή SPRINTER, ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων). Εναλλακτικά μπορείτε να εφαρμόσετε το CROPCARE 11-15-15+7CaO+15SO₃ + ιχνοστοιχεία.
 - Επιλεγμένοι τύποι λιπασμάτων της σειράς YaraMila διατίθενται με επικάλυψη τεχνολογίας PROCOTE με ιχνοστοιχεία ή με τεχνολογία παρεμπόδισης αζώτου. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.
- 3| Η σειρά YaraRega αποτελείται από κοκκώδη υδατοδιαλυτά λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν μέσω συστημάτων υδρολίπανσης ή επιφανειακά στο έδαφος.
- 4| Υδρολίπανση: Εναλλακτικά με τη σειρά YaraRega μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραπλήσιοι τύποι των κρυσταλλικών λιπασμάτων από τις σειρές YaraTera KRISTALON και YaraTera DELTASPRAY
- 5| YaraVita:
 - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
 - Στο στάδιο της πτώσης πετάλων και της καρπόδεσης μπορεί, αντί του YaraVita FRUTREL, να χρησιμοποιηθεί το YaraVita SENIPHOS.
 - Στις μετασυλλεκτικές εφαρμογές, εναλλακτικά με το YaraVita POWERBOR Ca μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός YaraVita ZINTRAC + YaraVita BORTRAC.
 - Για την ενίσχυση του κόκκινου χρώματος των καρπών (κόκκινες ποικιλίες) εφαρμόστε 1 με 2 ψεκασμούς του YaraVita SENIPHOS στην αλλαγή του χρώματος των καρπών και 7 ημέρες αργότερα. Να αποφεύγεται ο συνδυασμός του YaraVita SENIPHOS με διαφυλλικά σκευάσματα που περιέχουν ασβέστιο.
- 6| YaraAmplix:

Η σειρά YaraAmplix περιλαμβάνει τους βιοδιεγέρτες της Yara. Οι βιοδιεγέρτες επηρεάζουν θετικά την αποδοτικότητα χρήσης των θρεπτικών στοιχείων, την αντοχή των φυτών σε συνθήκες αβιοτικών καταπονήσεων (στρες), τα χαρακτηριστικά της ποιότητας παραγωγής και τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων που συγκρατούνται στο έδαφος και στη ριζόσφαιρα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την υπηρεσία [Tankmix](#) στον υπολογιστή ή το smartphone σας, για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ και βιοδιεγερτών YaraAmplix™ μεταξύ τους, καθώς και με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.

